

**Patient opéré d'une
lésion méniscale
du genou**

www.pacas.fr



Dr Gaspard FOURNIER
Dr François KELBERINE
Dr Barbara STAELENS
Dr Jean-Philippe VIVONA

VOUS ALLEZ ÊTRE OPÉRÉ D'UNE CHIRURGIE MÉNISCALE SOUS ARTHROSCOPIE

Qu'est-ce qu'une lésion méniscale ?

Le genou correspond à l'articulation entre la partie basse du fémur et la partie haute du tibia. Les surfaces articulaires de glissement sont recouvertes de cartilage. Les ménisques sont des petits coussins en forme de croissants localisés entre le fémur et le tibia. Il existe deux ménisques dans chaque genou : un ménisque interne et un ménisque externe.

Les ménisques sont constitués de fibrocartilage. Ils améliorent le contact et jouent un rôle d'amortisseurs entre le cartilage du fémur et celui du tibia. Leurs fonctions et leurs consistances font penser aux joints de plomberie. Avec le temps, les ménisques ont tendance à perdre leur hydratation et le cartilage a tendance à s'amincir.



Une lésion méniscale peut survenir lors d'un traumatisme important du genou ou à la suite de petits traumatismes répétitifs subis lors de certains mouvements. Cette lésion peut toucher une partie +/- importante du ménisque. Elle peut être stable ou instable, se présentant sous la forme d'une languette qui bouge dans l'articulation. Elle occasionne des douleurs, des blocages, des gonflements et parfois même des sensations d'instabilité du genou. Des lésions cartilagineuses peuvent être associées et participer à la symptomatologie douloureuse.

Pourquoi une opération ?

Les ménisques sont mal vascularisés et cicatrisent mal. La présence d'une lésion instable ne guérit pas spontanément - celle d'une lésion stable peut être traitée médicalement dans certains cas. Une chirurgie sera proposée s'il existe une lésion méniscale instable symptomatique ou une lésion méniscale stable non soulagée par le traitement médical.

Le but de l'opération est le soulagement des douleurs, des blocages, des gonflements et la reprise normale de la marche et de toutes les activités.

Qu'est-ce qu'une chirurgie méniscale ?

La chirurgie méniscale s'effectue sous arthroscopie, c'est-à-dire sans ouvrir l'articulation. Elle consiste à réaliser deux petites incisions de 5mm en avant du genou. Un arthroscope (une petite caméra) est introduit par l'une d'entre elles pour visualiser l'ensemble de l'articulation et notamment la lésion méniscale. Des instruments de petite taille sont introduits par l'autre incision pour réaliser le geste chirurgical.

Deux procédures sont envisageables en fonction de la lésion, en sachant que l'on essaiera au maximum d'être conservateur, c'est-à-dire de garder le plus de ménisque possible.

Si la lésion peut faire espérer une cicatrisation, une suture méniscale est réalisée, ce qui permet de garder l'intégralité du ménisque. Un ou plusieurs fils chirurgicaux sont passés dans la lésion et noués entre eux pour refermer la lésion sur elle-même, sur le même principe que des points de suture réalisés sur la peau. Ils permettent de stabiliser la lésion méniscale, le temps que celle-ci puisse cicatriser :



Si la lésion n'a aucune chance de cicatriser, la partie abîmée du ménisque est enlevée car elle n'est plus fonctionnelle et ne fait que provoquer une gêne : il s'agit de la méniscectomie. Celle-ci se fait à minima par des petites pinces en gardant toute la partie intacte du ménisque et en évitant autant que possible de l'enlever complètement :



Les lésions cartilagineuses peuvent être traitées dans le même temps opératoire.

Quelque soit la procédure, l'intervention dure 20 à 30 minutes et ne nécessite qu'une journée d'hospitalisation en ambulatoire : vous rentrez le matin et sortez le soir. L'intervention est réalisée sous rachianesthésie ou sous anesthésie générale. C'est votre anesthésiste qui décide avec vous de la meilleure anesthésie en fonction de votre état de santé.

Après l'opération, un pansement stérile est mis en place pendant 15 jours. Le traitement de la douleur sera mis en place, surveillé et adapté de manière très rapprochée dans la période post-opératoire.

La rééducation post-opératoire et la reprise des activités

Quelque soit l'intervention, la marche s'effectue à l'aide de deux cannes pendant 10 jours afin de soulager le genou de votre poids. La rééducation chez votre kinésithérapeute est débutée après l'intervention. Son but est de préserver la souplesse du genou et de maintenir la masse musculaire. La reprise du volant est envisageable au 4ème jour.

En cas de suture méniscale, la flexion du genou sera parfois limitée à 95° pendant quelques semaines selon la localisation de la lésion. La reprise du travail est envisageable après le 1er mois et cela en fonction de votre profession. Une activité de bureau pouvant être plus précoce. Les activités sportives débutent généralement entre le 3ème et le 6ème mois.

En cas de méniscectomie, il faut éviter la flexion « forcée » pendant 15 jours. La reprise du travail survient en général après le 15ème jour et cela en fonction de votre profession, une activité de bureau pouvant être plus précoce. Les activités sportives débutent généralement après 45 jours pour une méniscectomie interne et après 3 mois pour une méniscectomie externe.

Quels sont les risques et les complications ?

En plus des risques communs à toute intervention chirurgicale et des risques liés à l'anesthésie, notons quelques risques plus spécifiques à cette chirurgie :

- Une raideur articulaire peut se développer si la rééducation post-opératoire n'est pas bien prise en charge.
- Des réactions inflammatoires exacerbées correspondent parfois à une algodystrophie. Cependant, de nouveaux traitements existent et permettent de gérer plus facilement cette complication rare.
- Il est possible que la zone opérée saigne et qu'il se forme un hématome. En fonction de son importance, une évacuation peut être nécessaire.
- La survenue d'une infection de l'articulation reste exceptionnelle puisque le geste chirurgical est réalisé sous arthroscopie. Cette complication nécessite un lavage du genou et la mise sous antibiotiques plus ou moins longue avec éventuellement une reprise chirurgicale.
- Des petits caillots de sang solidifié peuvent se former et se coincer dans les veines des jambes, nécessitant un traitement anticoagulant pendant plusieurs semaines.

Les risques énumérés ne constituent pas une liste exhaustive. Votre chirurgien vous donnera toutes les explications complémentaires et se tiendra à votre disposition pour évoquer avec vous chaque cas particulier avec les avantages, les inconvénients et les risques de l'intervention.

Quels sont les résultats attendus de votre opération ?

Quelque soit la procédure, la disparition des blocages, des gonflements et des phénomènes d'instabilité est rapide après l'intervention. Le résultat sur la douleur peut dépendre de l'existence de lésions cartilagineuses sous-jacentes. Un traitement médical complémentaire peut alors s'avérer nécessaire. La récupération complète de la mobilité et de la force musculaire survient en général entre le 2ème et le 3ème mois.

Après une méniscectomie, une arthrose peut se développer à long terme, et cela en fonction de l'importance de la lésion méniscale initiale.

Concernant la suture méniscale, la cicatrisation n'est pas obtenue dans tous les cas. Une gêne peut alors réapparaître nécessitant une nouvelle arthroscopie afin de reséquer la partie non cicatrisée du ménisque.

Les résultats sont cependant très encourageants car les chances de cicatrisation sont de l'ordre de 60% pour un ménisque interne et de 75% pour un ménisque externe.

Vous avez des questions ?

Vous trouverez sur nos réseaux différentes vidéos pouvant y répondre :



@pacas13100



Pôle Aixois de Chirurgie
Articulaire et Sportive